



ClínicaVida

especialistas en cáncer
Fundación Colombiana de Cancerología



Recomendaciones para el Paciente: *Cirugía* de **Mohs**

Preparación para la intervención:



Siga las indicaciones del personal de cirugía. Si recibirá **anestesia general o sedación, deberá mantener un ayuno de 8 horas**. Si el procedimiento se realizará con **anestesia local**, podrá alimentarse normalmente.



Consulte con el anestesiólogo sobre la toma o suspensión de sus medicamentos habituales.



Informe a su médico si utiliza anticoagulantes, como warfarina, dabigatrán, rivaroxabán, apixabán, heparinas o enoxaparina, o si toma antiagregantes plaquetarios, como clopidogrel, aspirina, ticagrelor, prasugrel o ticlopidina, para ajustar su tratamiento antes del procedimiento.



Informe si utiliza **suplementos naturistas o productos fitoterapéuticos**.



Informe al personal de salud **si tiene marcapasos**.



Acuda con un acompañante que pueda proporcionar información sobre su estado de salud y brindarle apoyo después de la cirugía.



No lleve **objetos de valor**.



Asista con la piel y el cabello limpios, sin esmalte en las uñas, sin maquillaje y sin accesorios.



Use ropa cómoda.



Si utiliza prótesis dentales, piercings o lentes de contacto, **deberá retirarlos antes de ingresar a cirugía**.



Informe al personal de salud sobre cualquier **alergia a medicamentos, alimentos o materiales hospitalarios**.



Confirme con su médico el sitio de la lesión que será intervenida antes del procedimiento. Si es posible, márquela previamente y lleve una fotografía impresa o en su teléfono celular para facilitar su identificación.

Posibles riesgos y complicaciones:



Sangrado (hemorragia), que puede presentarse durante o después de la cirugía.



Hematomas (acumulación de sangre), que en algunos casos pueden requerir drenaje.



Complicaciones en la herida, como infección, dehiscencia (apertura de la herida) o necrosis (muerte del tejido o de la piel).



Alteraciones en la cicatrización, incluyendo retraso en la cicatrización, cicatrices anormales o resultados estéticos no satisfactorios.



Secuelas estéticas y/o funcionales, pérdida o alteración de la sensibilidad, así como dolor transitorio o crónico.

Recomendaciones posoperatorias:

Documentos enviados vía correo electrónico después de la cirugía:

- Copia de la descripción operatoria.
- Fórmula médica.
- Certificado de incapacidad médica (si se requiere).
- Orden para la cita de control o revisión.
- Instrucciones para el retiro de puntos.

Indicaciones sobre la alimentación



Si recibió anestesia general o sedación, inicie con alimentos líquidos y blandos. Posteriormente, incorpore alimentos sólidos de acuerdo con su tolerancia. Durante las primeras 24 horas, evite alimentos grasos, condimentados o productos lácteos.



Si su procedimiento fue realizado bajo anestesia local, no es necesario modificar su alimentación habitual.



Indicaciones sobre la actividad física

- Inicie la caminata tan pronto como sea posible.
- Si el procedimiento se realizó en la cara, procure dormir con la cabecera elevada o utilizando dos almohadas durante las primeras 48 horas.
- Evite apoyarse sobre el área intervenida.
- Durante el período de incapacidad, evite realizar esfuerzos físicos importantes, ejercicio intenso o levantar objetos pesados.



Cuidados de la herida



Mantenga las gasas y el micropore limpios y secos. No los retire hasta la cita de control o retiro de puntos.



Si la herida está cubierta con un apósito plástico transparente, puede mojarlo durante el baño. No lo retire hasta la cita de control o retiro de puntos.



Aplique hielo alrededor de la zona intervenida (nunca sobre la herida) durante 5 minutos cada 2 horas, por 48 horas.



Evite la exposición al sol y fuentes de calor directo, como cocinar, durante las primeras 48 horas.



Signos de alarma

Acuda al servicio de urgencias si presenta:



- Sangrado abundante de la herida quirúrgica que no se controla con presión local.



- Salida de líquido purulento o con mal olor por la herida.



- Calor, enrojecimiento o dolor intenso alrededor de la herida.



- Dolor o malestar general que no mejora con la medicación formulada.



- Fiebre de 38 °C o más.

Urgencias Clínica Vida

Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida

Sede hospitalaria

Dirección: Calle 20A #77-01,

Barrio Belén, Medellín, Antioquia.

Resultado de Patología

Durante la Cirugía de Mohs, el resultado de patología se obtiene durante el mismo procedimiento y queda consignado en su historia clínica. Por esta razón, no es necesario reclamar un resultado adicional.

Si, aun así, desea obtener una copia del resultado, puede solicitarla a través del correo electrónico archivo@clinicavida.com.

También puede realizar la solicitud de manera presencial en la Oficina de Archivo Clínico de nuestra Sede Hospitalaria, ubicada en la Avenida 80 # 18A - 140.

Horario de atención:

- Lunes a jueves: 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Viernes: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Controles con el especialista:

- Las citas de control con el especialista son programadas por el personal de la Clínica, de acuerdo con las indicaciones médicas. Si no recibe la confirmación de su cita por llamada telefónica o mensaje de texto, puede comunicarse con nuestras líneas de atención.
- En caso de tener dudas sobre la programación de su cita de control, otras citas médicas o el envío de documentos por correo electrónico, puede contactarnos a través de WhatsApp al 301 448 2828.



604 448 0016 – 604 444 0016



604 540 4394 Para usuarios de pólizas, prepagadas y servicios particulares.



0180 0052 0016 Línea gratuita nacional.